


« Démence : monitoring de la prise en charge » : indicateurs

Décès liés à un diagnostic de démence établi

Selon la statistique sur les causes de décès, en Suisse en 2018, un diagnostic de démence a été établi chez environ 11 285 personnes décédées (diagnostic principal ou secondaire), ce qui représente 16,8 % de la totalité des décès (67 088 cas) (G1). Depuis 2010, ce pourcentage a légèrement augmenté.

G1: Nombre de décès avec diagnostic de démence établi (diagnostic principal ou secondaire en cas de décès) et pourcentage par rapport au total des décès




Remarques : Pour les années 2017 et 2018, l'OFS ne disposait que de données sur les diagnostics principaux en cas de décès. Le nombre de décès avec un diagnostic secondaire de démence établi était estimé à partir du taux moyen, par rapport au total des décès liés à un diagnostic de démence, des décès liés à un diagnostic principal de démence établi entre 2014 et 2016
Source : OFS, Statistique sur les causes de décès

Un peu plus de deux tiers des décès répertoriés en 2018 et liés à la démence (diagnostic principal en cas de décès) concernaient des femmes et près d'un tiers des hommes (G2).¹

G2: Décès liés à un diagnostic de démence établi en 2018

(Diagnostic principal en cas de décès) selon le sexe



Source: OFS, Statistique sur les causes de décès 2018


¹ Le graphique montre la part des femmes pour les diagnostics principaux. Si l'on tient compte des diagnostics secondaires, cette part devrait alors, comme pour les années 2010 à 2015, être de 1 à 3 points de pourcentage plus basse.

Peut-on mourir de démence ? Dans la statistique, est considérée comme cause principale de décès la maladie qui est à l'origine de l'évolution morbide (chaîne de cause à effet). Dans les pathologies de la démence, la perte progressive des fonctions cérébrales entraîne souvent une défaillance respiratoire ou des troubles de la déglutition qui peuvent déboucher sur une pneumonie en phase terminale. De nombreuses autres maladies consécutives surviennent en cas de défaillance généralisée des fonctions vitales centrales (OFS 2019, 2).

Le diagnostic secondaire de démence n'est compris dans les chiffres présentés que si le diagnostic principal relève d'un autre groupe de maladies.

Comme on pouvait s'y attendre, la répartition des cas varie fortement selon le groupe d'âge (G3). Chez les moins de 65 ans, les décès avec diagnostic de démence établi sont relativement rares. Par contre en 2018, pour les personnes décédées de 85 ans et plus, un diagnostic principal ou secondaire de démence a été établi pour environ à 29,9 % des femmes et 20,5 % des hommes.

G3: Pourcentage des décès avec diagnostic de démence établi par rapport au nombre total de décès en 2018 par groupe d'âge et sexe



Remarques : Pour 2018, l'OFS ne disposait que de données sur les diagnostics principaux en cas de décès. Le nombre de décès avec un diagnostic secondaire de démence établi était estimé à partir du taux moyen selon le sexe et l'âge, par rapport au total des décès liés à un diagnostic de démence, des décès liés à un diagnostic principal de démence établi pour les années 2013 à 2015.

Source : OFS, Statistique sur les causes de décès 2018

Données existantes et méthodes

La **Statistique des causes de décès et des mortinaissances (CoD)** renseigne sur l'évolution ainsi que sur les causes de la mortalité en Suisse. Elle repose sur le certificat médical précisant la cause du décès. Le diagnostic est mentionné verbalement, le codage selon la CIM-10 est effectué à l'OFS en suivant les règles internationales. Quatre diagnostics au maximum sont enregistrés (diagnostics principal et secondaires). La statistique des causes de décès se rapporte aux personnes domiciliées en Suisse, c'est-à-dire à la population résidente permanente.

Source / lien : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/enquetes/ecod.html>; tableaux de données utilisés : Causes de décès les plus fréquentes et nombre de cas, T 14.03.04.01.02 / 01

Bibliographie

BFS Bundesamt für Statistik (2019): Todesursachenstatistik. Sterblichkeit und deren Hauptursachen in der Schweiz 2016, BFS Aktuell, Neuchâtel: Bundesamt für Statistik